

Kampaň: Jaro 2018

Hladina kortizolu před podáním Vetorylu: vylepšený protokol monitorování

Připravili: Ian Ramsey BVSc, PhD, DSAM, Dipl. ECVIM-CA, FHEA, MRCVS, Federico Fracassi DVM, PhD, Dipl. ECVIM-CA, Nadja Sieber-Ruckstuhl PhD, Dr. med. vet., Dipl. ACVIM, Dipl. ECVIM-CA

Anamnéza a klinické vyšetření

Nejdůležitějším faktorem, který je třeba vzít v úvahu při kontrolním hodnocení psa, který užívá přípravek Vetoryl, je podrobný rozhovor s jeho majitelem zaměřený na klinickou odpověď na léčbu v domácím prostředí. Tato nejdůležitější část návštěvy může být často při rušném provozu na klinice přehlížena. Pro zajištění dobré compliance, bezpečnosti a optimální odpovědi na léčbu je však zcela zásadní.

Majitelé, kteří opakovaně uvádějí, že jejich psi se nedáří dobře, by měli bezodkladně navštívit veterinární praxi, aby mohli být vyloučen iatrogenní hypoadrenokorticismus (pomocí měření kortizolu a výsledků hematologie, biochemie a analýzy elektrolytů).

Hladina kortizolu před podáním Vetorylu

Vhodní psi

- Vetoryl podáván jednou nebo dvakrát denně
- Hyperadrenokorticismus související s postižením nadledvin nebo hypofýzy (Adrenal- or pituitary-dependent hyperadrenocorticism (HAC))
- Psi, kteří se klinicky daří dobře (s příznaky nebo bez příznaků HAC)
- Psi klidné povahy

Nevhodní psi

- Psi agresivní
- Psi stresovaní (např. neustále štěkají)
- Psi, kteří se necítí dobře

Návštěva kliniky

- Domluvte si schůzku těsně předtím, než by měla být podána další dávka Vetorylu
- Pokud pes běžně dostává Vetoryl v nevhodující čas (např. v 6 hodin ráno), poproste majitele, aby předcházející den podal psovi Vetoryl vyjimečně později (např. až v 9 hod.)
- Ujistěte se, že majitel skutečně nepodal Vetoryl, a že se ráno nestalo nic stresujícího (např. zvracení, poranění)
- Ujistěte se, že majitel vyplnil dotazník „Kvalita života psa“
- Získejte anamnézu* a klinicky psa vyšetřete s důrazem na příznaky HAC

Vzorek


- Vzorek odeberte ihned po vyšetření psa, před podáním Vetorylu
- Do zkumavky s heparinem nebo sérové zkumavky odeberte 1 až 2 ml krve
- Sérum může být separováno a uchováváno až 1 týden

- Vzorek odeslete do externí laboratoře splňující podmínky externího schématu kvality přesnosti - ESVE- nebo SCE- program (external quality assurance scheme) a používající ke stanovení přednostně Siemens IMMULITE® – nebo metodu, které byla validována vůči tomuto přístroji.

* K dispozici je online „deník“ pro majitele



Hladina kortizolu před podáním Vetorylu: zdokonalený protokol monitorování



¹ Polyurie / polydipsie, polyafagie, dehydratace a letargie by měly odeznít nebo se zmírnit za 1 měsíc. Zmrzlí/odeznění alopecie a kapkovitého tvaru břicha může trvat 3-6 měsíců.
² Znovu přezkoumejte anamnézu a uvažujte o ACTH stimulačním testu před podáním Vetorylu. Další informace získáte od technické podpory společnosti Dechra.

³ Pokud nejsou v době mezi jednotlivými denními dávkami příznaky dostatečně utlumeny, zvýšte zvýšení celkové denní dávky až o 50 % a ještě rozdělení rovnoměrně mezi ranní a večerní podání.

⁴ Použijte kombinaci kapslí různé gramáže pro zvýšení nebo snížení dávky podávané jednou nebo dvakrát denně

⁵ Dexometazon pro léčbu hypokortizolemie, IV 0,9% NaCl k léčbě dehydratace a hyperkaliemie; alternativně hydrokortizon CRI a IV 0,9% NaCl

Vetoryl: Vetoryl obsahuje Triostane