



## РЕЄСТРАЦІЙНЕ ПОСВІДЧЕННЯ REGISTRATION CERTIFICATE

Відповідно до Закону України «Про ветеринарну медицину», постанови Кабінету Міністрів України від 21.11.2007 р. № 1349 «Про затвердження положень про державну реєстрацію ветеринарних препаратів, кормових добавок, преміксів та готових кормів» та на підставі експертного висновку 14.11.2019 № 4352-К/06, рекомендацій Державної фармакологічної комісії ветеринарної медицини, наказу Державної служби України з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів 26.11.2019 № 1148 зареєстровано:

продукт Каніквантель® плюс

форма Таблетки

Власник реєстраційного посвідчення:

**ЛОКСАВЕТ фарма ГмбХ**

**Макс-Планк-Штрассе, 11, Д-85716, Унтершляйсхайм, НІМЕЧЧИНА**

зареєстровано в Україні за № АА-00915-01-08 від 26.11.2019

Виробник:

**Хаупт Фарма Берлін ГмбХ**

**Моосрозенштрассе, 7, 12347, Берлін, НІМЕЧЧИНА**

При будь-якій зміні в реєстраційному досьє власник посвідчення (виробник) повинен повідомити орган реєстрації.

Обов'язкові додатки:

- коротка характеристика препарату (додаток 1);
- листівка-вкладка препарату (додаток 2);
- етикетка (додаток 3).

Реєстраційне посвідчення дійсне до: 25.11.2024

Це посвідчення не є зобов'язанням щодо закупівлі даного продукту.



Державна служба України з питань  
безпеки харчових продуктів  
та захисту споживачів



ДЕРЖАВНИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ  
КОНТРОЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ВЕТЕРИНАРНИХ  
ПРЕПАРАТІВ ТА КОРМОВИХ ДОБАВОК

НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНСТВО ВЕТЕРИНАРНИХ  
ПРЕПАРАТІВ ТА КОРМОВИХ ДОБАВОК

вул. Донецька, 11, м. Львів, 79019  
тел.: (032) 252 82 84; факс: (032) 252 11 93  
e-mail: agency@scivp.lviv.ua www.scivp.lviv.ua  
ЄДРПОУ 00485670

State Service for Food Safety and  
Consumer Protection  
of Ukraine

STATE SCIENTIFIC RESEARCH CONTROL  
INSTITUTE OF VETERINARY MEDICAL  
PRODUCTS AND FEED ADDITIVES

NATIONAL AGENCY OF VETERINARY MEDICINAL  
PRODUCTS AND FEED ADDITIVES

Donetska str., 11, Lviv, 79019, Ukraine  
el.: +38 032 252 82 84; fax: +380 32 252 11 93  
e-mail: agency@scivp.lviv.ua www.scivp.lviv.ua  
EDRPOU 00485670

14.11.2019 № 4352-К/06

**Директору Департаменту безпеки  
харчових продуктів та ветеринарної  
медицини Держпродспоживслужби  
Кобалю Б.І.**

**ЛОКСАВЕТ фарма ГмбХ, НІМЕЧЧИНА**

## **ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК**

за результатами наукової експертизи реєстраційного досьє та аналітичних випробувань препарату  
Каніквантель® плюс  
власник ЛОКСАВЕТ фарма ГмбХ, (НІМЕЧЧИНА)  
виробник Хаупт Фарма Берлін ГмбХ, (НІМЕЧЧИНА)  
згідно з контрактом № 265 від 25.06.2019 р.

За результатами проведеної наукової експертизи реєстраційного досьє та випробувань  
препарату Каніквантель® плюс, Таблетки, власник ЛОКСАВЕТ фарма ГмбХ, (НІМЕЧЧИНА),  
виробник Хаупт Фарма Берлін ГмбХ, (НІМЕЧЧИНА) рекомендовано його перереєстрацію в  
Україні.

Реєстраційне посвідчення: АА-00915-01-08

**Директор Інституту,  
д.в.н., професор,  
академік НААН**

**Голова Агентства, д.б.н.**

**І.Я. Коцюмбас**

**Ю.М. Косенко**



26.11.2019

## Коротка характеристика препарату

### 1. Назва

Каніквантель® плюс

### 2. Склад

Одна таблетка (612 мг) містить діючі речовини:

празіквантел - 50,0 мг;

фенбендазол - 500,0 мг.

Допоміжні: натрію лаурил сульфат, повідон 25, стеарат магнію, спеціальний сухий ароматизатор м'яса.

### 3. Фармацевтична форма

Таблетки.

### 4. Фармакологічні властивості

*АТСvet QP52A, протитрематодні, протинематодні і протицестодні ветеринарні препарати (QP52AA51, празіквантел, комбінації)*

Фармакологічні властивості препарату ґрунтуються на властивостях діючих речовин.

**Празіквантел** активний проти цестод (стьожкові гельмінти), підвищує проникливість мембран для іонів кальцію, викликає підвищенням'язової активності, яке змінюється скороченням мускулатури та спастичним паралічем, викликає руйнування зовнішнього покриву дорослих форм цестод. У деяких випадках стьожкові гельмінти під дією празіквантелу повністю перетравлюються і не виявляються у фекаліях.

**Фенбендазол** (група бензімідазолів) інгібує ферментну систему гельмінтів, що призводить до порушення енергетичного обміну та спричиняє загибель паразитів від виснаження. Має високу антигельмінтну активність і широкий спектр дії, знищує личинки зрілих нематод, деякі види цестод, трематод і їхні яйця.

### 5. Клінічні особливості

#### 5.1 Вид тварин

Собаки та коти.

#### 5.2 Показання до застосування

Дегельмінтизація собак та котів при ураженні:

нематодами – *Toxocara canis*, *Toxascaris leonina*, *Ancylostoma caninum*, *Uncinaria stenocephala*, *Trichuris vulpis*;

цестодами – *Dipylidium caninum*, *Taenia spp.*, *Echinococcus spp.*, *Mesocestoides spp.*

трематодами – *Opisthorchis felineus*, *Alaria alata*, *Pseudamphistomum truncatum*, *Echinochasmus perfoliatus*.

#### 5.3 Протипоказання

Не застосовувати хворим, виснаженим та ослабленим тваринам.

Не застосовувати цуценятам та кошенятам віком до 3-х тижнів.

#### 5.4 Побічна дія

Немає.

#### 5.5 Особливі застереження при використанні

Немає.

#### 5.6 Використання під час вагітності, лактації, несучості

Не рекомендується застосовувати самкам під час вагітності.

#### 5.7 Взаємодія з іншими засобами та інші форми взаємодії

Невідома.

#### 5.8 Дози і способи введення тваринам різного віку

Рекомендована доза - 5 мг празіквантелу та 50 мг фенбендазолу на 1 кг маси тіла.

Це відповідає 1 таблетці *Каніквантель® плюс* на 10 кг маси тіла.

Рекомендовані дози препарату *Каніквантель® плюс*:



26.11.2019

<i>Вид тварин</i>	<i>Маса тіла, кг</i>	<i>Доза (таблетка)</i>
<i>Коти</i>	< 2	1/4
	2 – 4	1/2
	> 4	3/4
<i>Цуценята та собаки малих порід</i>	< 2	1/4
	2 – 5	1/2
	5- 10	1
<i>Собаки середніх порід</i>	10 – 15	1 1/2
	15 – 25	2
	25 - 30	3
<i>Собаки великих порід</i>	30 – 40	4
	40 - 50	5

Таблетки згодують тваринам примусово або з кормом. Попередньо голодної дієти або особливого режиму годівлі не потрібно.

При лікувальній дегельмінтизації рекомендується повторне застосування препарату через 3 доби. Профілактичну дегельмінтизацію проводять 1 раз у квартал.

#### **5.9 Передозування (симптоми, невідкладні заходи, антидоти)**

Клінічних ознак передозування при застосуванні препарату у рекомендованих дозах не спостерігається.

При збільшенні рекомендованої дози у 3-5 разів у собак та при застосуванні впродовж періоду, який вдвічі довший від рекомендованого, не виникає ніяких клінічних ознак передозування.

Коти є більш чутливими і при передозуванні можливі симптоми: пригнічення, блювота, діарея, які швидко зникають без застосування терапевтичних засобів. Спеціальних антидотів не має.

#### **5.10 Спеціальні застереження**

Спеціальних застережень немає.

#### **5.11 Період виведення (каренція)**

Для непродуктивних тварин не регламентується.

#### **5.12 Спеціальні застереження для осіб і обслуговуючого персоналу**

При роботі з препаратом необхідно дотримуватися основних правил гігієни та безпеки, що прийняті при роботі з ветеринарними препаратами.

### **6. Фармацевтичні особливості**

#### **6.1 Форми несумісності (основні)**

Невідомі.

#### **6.2 Термін придатності**

4 роки.

#### **6.3 Особливі заходи зберігання**

Зберігають препарат у сухому темному місці, в упакованні виробника при температурі не вище 25 °С.

#### **6.4 Природа і склад контейнера первинного пакування**

Блістери (PVC) по 12 таблеток, упаковані у картонні коробки.

#### **6.5 Особливі заходи безпеки при поводженні з невикористаним препаратом або із його залишками**

Невикористаний або протермінований препарат повинен бути утилізований у відповідності з національними вимогами.

2 6. 1 1 2019

**7. Назва і місце знаходження власника реєстраційного посвідчення**

ЛОКСАВЕТ фарма ГмбХ  
Макс-Планк-Штрассе, 11,  
Д-85716, Унтершляйсхайм,  
Німеччина

LOXAVET pharma GmbH  
Max-Planck-Strasse, 11,  
D-85716, Unterschleissheim  
Germany

**8. Назва і місце знаходження виробника**

Хаупт Фарма Берлін ГмбХ  
Моосрозенштрассе 7, 12347, Берлін, Німеччина

Haupt Pharma Berlin GmbH (Germany)  
Moosrosenstrasse, 7, 12347 Berlin

**9. Додаткова інформація**



2 6. 1 1. 2019

**Каніквантель® плюс**  
**(таблетки)**  
листівка-вкладка

**Опис**

Круглі таблетки блідо-жовтого кольору із двома перехресними роздільними пасками із ароматом м'яса.

**Склад**

Одна таблетка (612 мг) містить діючі речовини:

празіквантел - 50,0 мг;

фенбендазол - 500,0 мг.

Допоміжні: натрію лаурил сульфат, повідон 25, стеарат магнію, спеціальний сухий ароматизатор м'яса.

**Фармакологічні властивості**

*ATCvet QP52A, протитрематодні, протинематодні і протицестодні ветеринарні препарати (QP52AA51, празіквантел, комбінації)*

Фармакологічні властивості препарату ґрунтуються на властивостях діючих речовин.

**Празіквантел** активний проти цестод (стьожкові гельмінти), підвищує проникливість мембран для іонів кальцію, викликає підвищенням'язової активності, яке змінюється скороченням мускулатури та спастичним паралічем, викликає руйнування зовнішнього покриву дорослих форм цестод. У деяких випадках стьожкові гельмінти під дією празіквантелу повністю перетравлюються і не виявляються у фекаліях.

**Фенбендазол** (група бензімідазолів) інгібує ферментну систему гельмінтів, що призводить до порушення енергетичного обміну та спричиняє загибель паразитів від виснаження. Має високу антигельмінтну активність і широкий спектр дії, знищує личинки зрілих нематод, деякі види цестод, трематод і їхні яйця.

**Застосування**

Дегельмінтизація собак та котів при ураженні:

нематодами – *Toxocara canis*, *Toxascaris leonina*, *Ancylostoma caninum*, *Uncinaria stenocephala*, *Trichuris vulpis*;

цестодами – *Dipylidium caninum*, *Taenia spp.*, *Echinococcus spp.*, *Mesocestoides spp.*

трематодами – *Opisthorchis felineus*, *Alaria alata*, *Pseudamphistomum truncatum*, *Echinochasmus perfoliatus*.

**Дозування**

Рекомендована доза - 5 мг празіквантелу та 50 мг фенбендазолу на 1 кг маси тіла.

Це відповідає 1 таблетці **Каніквантель® плюс** на 10 кг маси тіла.

Рекомендовані дози препарату **Каніквантель® плюс**:

<b>Вид тварин</b>	<b>Маса тіла, кг</b>	<b>Доза (таблетка)</b>
<b>Коти</b>	< 2	¼
	2 – 4	½
	> 4	¾
<b>Цуценята та собаки малих порід</b>	< 2	¼
	2 – 5	½
	5- 10	1
<b>Собаки середніх порід</b>	10 – 15	1½
	15 – 25	2
	25 - 30	3
<b>Собаки великих порід</b>	30 – 40	4
	40 - 50	5

Таблетки згодують тваринам примусово або з кормом. Попередньо голодної дієти або особливого режиму годівлі не потрібно.



26.11.2019

При лікувальній дегельмінтизації рекомендується повторне застосування препарату через 3 доби. Профілактичну дегельмінтизацію проводять 1 раз у квартал.

**Протипоказання**

Не застосовувати хворим, виснаженим та ослабленим тваринам.

Не застосовувати цуценятам та кошенятам віком до 3-х тижнів.

**Застереження**

При роботі з препаратом необхідно дотримуватися основних правил гігієни та безпеки, прийнятих при роботі з ветеринарними препаратами.

**Форма випуску**

Блістери (PVC) по 12 таблеток, упаковані у картонні коробки.

**Зберігання**

Зберігають препарат у сухому темному місці, в упакованні виробника при температурі не вище 25 °С.

**Термін придатності**

4 роки.

*Для застосування у ветеринарній медицині!*

**Назва і місце знаходження власника реєстраційного посвідчення**

ЛОКСАВЕТ фарма ГмбХ  
Макс-Планк-Штрассе, 11,  
Д-85716, Унтершляйсхайм,  
Німеччина

LOXAVET pharma GmbH  
Max-Planck-Strasse, 11,  
D-85716, Unterschleissheim  
Germany

**Назва і місце знаходження виробника**

Хаупт Фарма Берлін ГмбХ  
Моосрозенштрассе 7, 12347, Берлін, Німеччина

Haupt Pharma Berlin GmbH (Germany)  
Moosrosenstrasse, 7, 12347 Berlin

Реєстраційне посвідчення:

Термін придатності:

Серія:



# Каніквантель® плюс

Антигельмінтик широкого спектру дії  
для собак та котів

**12** ТАБЛЕТОК  
ДЛЯ ПЕРОРАЛЬНОГО  
ЗАСТОСУВАННЯ

Склад: одна таблетка (612 мг) містить діючі речовини:

- празіквантел ..... 50,0 мг;
- фенбендазол ..... 500,0 мг;

Дозування. Рекомендована доза — 5 мг празіквантелю та 50 мг фенбендазолу на 1 кг маси тіла. Це відповідає 1 таблетці Каніквантель® Плюс на 10 кг маси тіла.

Фармакологічні властивості: АТCvet QP52A, протитрематодні, протинематодні і протицестодні ветеринарні препарати (QP52AA51, празіквантел, комбінація).

Рекомендовані дози Каніквантель® Плюс:

Вид тварин	Маса тіла, кг	Доза, таблетка
Коти	< 2	¼
	2 – 4	½
	> 4	¾
Щуценята та собаки малих порід	< 2	¼
	2 – 5	½
Собаки середніх порід	5 – 10	1
	10 – 15	1½
	15 – 25	2
Собаки великих порід	25 – 30	3
	30 – 40	4
	40 – 50	5

Застосування. Дегельмінтизація собак та котів при:

нематодозах: *Toxocara canis*, *Toxascaris leonina*, *T. gati (mysta)*, *Ancylostoma caninum*, *Uncinaria stenocephala*, *Trichuris vulpis*;

цестодозах: *Echinococcus granulosus*, *E. multilocularis*, *Dipylidium caninum*, *Taenia spp.*, *Mesocostoides spp.*

трематодозах: *Opisthorchis felineus*, *Alaria alata*, *Pseudamphistomum truncatum*, *Echinochasmus perfoliatus*.

Зберігати в сухому темному місці в упакованні виробника при температурі не вище 25°C.



Офіційний дистрибутор в Україні:  
компанія ТОВ «Симедіка Україна»  
м. Київ, вул. Курявський узвіз 7, тел.: +38 (044) 461 88 61  
www.symedica.com  
Ліцензія АВ № 613395 від 28.03.2012 р.



**12** ТАБЛЕТОК  
ДЛЯ ПЕРОРАЛЬНОГО  
ЗАСТОСУВАННЯ



# Каніквантель® плюс

Антигельмінтик широкого спектру дії  
для собак та котів

Власник реєстраційного посвідчення:  
ЛОКСАВЕТ Фарма ГмбХ  
Мас-Планк-Штрассе, 11  
D-85716, Уттершілсайм, Німеччина



Виробник:  
Хутт Фарма Берлін ГмбХ  
Моорозенштрассе, 7  
12347, Берлін, Німеччина

# Каніквантель® плюс

Антигельмінтик широкого спектру дії  
для собак та котів

**12** ТАБЛЕТОК  
ДЛЯ ПЕРОРАЛЬНОГО  
ЗАСТОСУВАННЯ