

**URILIN®**



**Ľahká  
a osvedčená  
liečba močovej  
inkontinencie.**

# URILIN®

## ĽAHKÁ A OSVEDČENÁ LIEČBA MOČOVEJ INKONTINENCIE

### ČO JE TO MOČOVÁ INKONTINENCIA?

Močová inkontinencia je samovoľný únik moču. Môže sa objaviť pri psoch aj sukách akéhokoľvek plemena.

Pri stredne starých až starších kastrovaných sukách je najčastejším typom inkontinencie nedostatočnosť zvierača močovej trubice (USMI). Väčšie plemená sú ku vzniku inkontinencie vnímavejšie.

### ČO JE PRÍČINOU MOČOVEJ INKONTINENCIE?

Moč je zhromažďovaný v močovom mechúre. Odtoku moču pri naplnení mechúra bráni vnútorný zvierač pri odstupe močovej trubice. Keď sa mechúr úplne naplní a zviera potrebuje močiť, uvoľní sa ako vnútorný tak vonkajší sfinkter.

Pri psoch z USMI neplní vnútorný sfinkter svoju úlohu. Moč z mechúra odteká aj mimo urinácie. Problém sa zhoršuje pri zvieratách s nadváhou, polydipsiou a močovou infekciou.


Inkontinencia Vášho psa prináša stres nie len jemu, ale tiež Vám.

### KLINICKÉ PRÍZNAKY

Môžete zaznamenať niektoré alebo všetky uvedené klinické príznaky:

- Škvvrny moču na miestach, kde Váš pes ležal
- Intenzívne čistenie vulvy a okolia
- Infekcie močového mechúra
- Infekcie a zápach v okolí vulvy
- Únik moču pri štekaní

### Normálna anatómia močového mechúra



# AKO SA INKONTINENCIA DIAGNOSTIKUJE?

Veterinár diagnózu často stanoví na základe klinických príznakov, ktoré pes vykazuje. Môžete byť požiadaní o odobratie vzorky moču, aby bolo možné vylúčiť ďalšie príčiny postihnutia močových ciest, napríklad infekciu. Pes môže trpieť infekciou aj USMI zároveň. Ďalšie formy inkontinencie môžu vyžadovať náročnejšie vyšetrenia, napríklad RTG.

# AKO JE MOŽNÉ USMI LIEČIŤ?

Dobrá správa – s liekom Urilin® je liečba USMI ľahká a Váš pes môže žiť šťastný život. Urilin® obsahuje látku fenylpropanolamín, ktorá stimuluje kontrakcie „vnútorného“ močového zvierača.

Tým liek pôsobí proti nevhodnému úniku moču, ku ktorému pri psoch s USMI dochádza.

Liek neovplyvní vedomú urináciu. Urilin® má minimálne nežiaduce účinky.

Urilin® je sirup a musí byť podávaný denne po celý zvyšok života. Jednoducho sa nakvapká na krmivo.

# AKO POUŽÍVAŤ KVAPKACIU FĽAŠTIČKU LIEKU URILIN® SIRUP

Fľaštičku s liekom obráťte nad miskou hrdlom nadol a nakvapkajte na krmivo toľko kvapiek, koľko veterinár Vášmu psovi predpísal. Niekedy je potrebné liekovkou jemne nad miskou potriať, aby začala kvapkať. Akonáhle sa kvapky uvoľnia, už netraste.

# MONITORING LIEČBY

Dodržujte pravidelné kontroly svojho zvieraťa veterinárom.

# PREČO POUŽÍVAŤ URILIN®?

- PREUKÁZANÁ ÚČINNOSŤ AKTÍVNEJ LÁTKY, FENYLPROPANOLAMÍNU<sup>1</sup>
- OSVEDČENÁ CHUTNOSŤ<sup>2</sup>
- RÝCHLY ÚČINOK<sup>1</sup>
- ĽAHKO A RÝCHLO
- KVAPKACÍ UZÁVER
- PRESNÉ DÁVKOVANIE

<sup>1</sup> Scott L. (2002). Hodnotenie účinnosti fenylpropanolamínu pri liečbe inkontinencie močového zvierača pri sučkách, JSAP, 43, 493-496

<sup>2</sup> Údaje z firemnej databázy DECHRA

Urilin® je viazaný na veterinárny predpis.



# URILIN®

SIRUP NA LIEČBU MOČOVEJ  
INKONTINENCIE SPÔSOBENEJ  
NEDOSTATOČNOSŤOU  
ZVIERAČA MOČOVEJ TRUBICE

Odporúčané dávkovanie Urilinu® je 1 mg/kg živej hmotnosti 3x denne v krmive.  
To zodpovedá 0,1 ml Urilinu® sirupu na 5 kg živej hmotnosti alebo 1 kvapka  
(2,34 mg) na každých 2,34 kg živej hmotnosti.

## Tabuľka dávkovania - Urilin® sirup

| Dávkovanie 3x denne v krmive * |                                     |                                      |                               |
|--------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|
| Hmotnosť<br>psa (kg)           | Počet kvapiek<br>v jednom<br>kŕmení | Celkový<br>počet kvapiek<br>za 1 deň | Celkový<br>počet ml<br>za deň |
| 5                              | 2                                   | 6                                    | 0,3                           |
| 10                             | 4                                   | 12                                   | 0,6                           |
| 15                             | 6                                   | 18                                   | 0,9                           |
| 20                             | 8                                   | 24                                   | 1,2                           |
| 25                             | 10                                  | 30                                   | 1,5                           |
| 30                             | 13                                  | 39                                   | 1,8                           |
| 35                             | 15                                  | 45                                   | 2,1                           |
| 40                             | 17                                  | 51                                   | 2,4                           |
| 45                             | 19                                  | 58                                   | 2,7                           |
| 50                             | 21                                  | 64                                   | 3                             |

*\* odporúča sa podávať s menším množstvom krmiva, aby sme mali istotu, že pes zjedol požadovanú dávku sirupu*

**Dávkovanie:** 1 kvapka (2,34 mg) na 2,34 kg živej hmotnosti.  
Každý 1 ml Urilinu® obsahuje 50 mg  
fenylpropanolamínu hydrochloridu PhEu.