

Экофлис

Циперметрин (цис/транс - 80/20) - 100 мг/мл
Раствор для наружного применения

- Эффективен против всех наиболее значимых эктопаразитов.
- Для обработки животных и помещений.
- Соотношение цис/транс изомеров 80/20 в два раза более эффективно привычно используемых цис/транс изомеров в соотношении 50/50 или 40/60.
- Защита от эктопаразитов не менее 2-х недель.
- Применяется всем видам сельскохозяйственных животных.
- Легко переносится животными, не вызывает побочного действия.
- В два раза менее токсичен для млекопитающих по отношению к альфациперметрину и дельтаметрину.
- Экономичен.
- 10% концентрация - в 2 раза выше аналогов.



Упаковка:

Алюминиевые бутылки по 250 мл и 1000 мл



Подробная информация о препарате
с обратной стороны

Bimeda®

Представитель Bimeda
на территории Таможенного Союза

Симедика РУ

тел. +7 (495) 943-00-67 • info@cymedica.com
www.cymedica.com/ru/

Cymedica

Экофлис

Циперметрин (цис/транс - 80/20) - 100 мг/мл
Раствор для наружного применения

ФАРМАКОТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ГРУППА:

Инсектоакарицидный препарат, синтетический пиретроид.

НАЗНАЧЕНИЕ:

Для борьбы с эктопаразитами крупного рогатого скота, овец, коз, птицы и свиней и обработки помещений.

ПРИМЕНЕНИЕ И ДОЗИРОВКИ:

Овец обрабатывают методом купания в пропływных ваннах, крупный рогатый скот и коз купают или опрыскивают, свиней и птиц опрыскивают с использованием аппаратуры, обеспечивающей мелкодисперсное распыление.

Водную эмульсию Экофлиса готовят непосредственно перед применением. При этом определяют объем эмульсии, необходимый для обработки животных, и количество препарата Экофлис, которое требуется для её приготовления.

Дозировки препарата Экофлис для обработки животных:

Опрыскивание:

Во время обработки необходимо добиться намочения всего шерстного покрова животного в эмульсии. Сельскохозяйственных птиц (кур, гусей, уток, индеек), пораженных пухопероедами и куриными клещами, обрабатывают мелкокапельным опрыскиванием, из расчета 15-20 мл на одну птицу.

Обработка помещений:

Для уничтожения эктопаразитов во внешней среде смешивают 100 мл Экофлиса в 5-10 литрах воды и опрыскивают поверхности с нормой расхода 80-100 мл/м².

ОГРАНИЧЕНИЯ ПОСЛЕ ПРИМЕНЕНИЯ

Убой животных на мясо разрешается через 10 суток после последнего применения лекарственного препарата. Яйца кур-несушек, после обработки Экофлисом, разрешается использовать на общих основаниях.

Вид животного	Вид эктопаразита	Вид обработки	Расход на 1 л водной эмульсии , мл	Расход готовой эмульсии	Кратность обработок
Крупный рогатый скот	Все виды эктопаразитов	Купание	1	-	Лечение – двукратно 1 раз в 10-14 дней, профилактика - однократно
		Опрыскивание всего тела		2-4 л/гол	
	Зоофильные мухи	Опрыскивание вдоль позвоночника	5	500 мл/гол	1 раз в 10-14 дней
	Клещи	Опрыскивание всего тела	1	2-4 л/гол	Лечение – двукратно 1 раз в 10-14 дней, профилактика - однократно
	Вши		0, 5		
	Гиподерматоз	Опрыскивание	2-5	200-500 мл/гол	
Овцы, козы	Все виды эктопаразитов	Купание	1	-	Лечение – двукратно 1 раз в 10-14 дней, профилактика - однократно
	Вши		0,5		
Козы, стриженные овцы	Все виды эктопаразитов	Опрыскивание	1	2 л/гол	Лечение – двукратно 1 раз в 7-10 дней, профилактика - однократно
	Вши		0,5		
Свиньи	Саркоптоз, гематопиноз		1	400-500 мл/гол	
			Птица	Клещи	

Купка:

В предварительно очищенную ванну наливают чистую воду, затем добавляют препарат Экофлис, и тщательно перемешивают.

Во время обработки животное должно находиться в ванной 50-60 секунд. При этом животных 2-3 раза полностью окунают в эмульсию препарата. После выхода из ванны, животных оставляют на 10-15 минут на специальной площадке для стекания эмульсии. Восполнение ванны производят после уменьшения объема купочной эмульсии более чем на 10%.

ХРАНЕНИЕ:

В сухом, защищенном от света месте, при температуре от 0°C до 25°C.

Срок годности лекарственного препарата:

- в закрытой упаковке – 3 года;
- после вскрытия флакона – не более 28 суток.

УПАКОВКА:

Алюминиевые бутылки по 250 мл и 1000 мл.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:

«Bimeda Chemicals Export», Ирландия.

