


PHENOXYPEN[®] WSP 325 mg/g

Феноксипен WSP

Антибиотик №1 для лечения некротического энтерита у птиц, вызванного *Clostridium perfringens*

Некротический энтерит является чрезвычайно серьезным заболеванием у птицы.


- Клиническая форма заболевания вызывает высокую смертность.
- Субклиническая болезнь приводит к большим экономическим потерям в связи с:
 - повышенной смертностью;
 - снижением темпов роста;
 - нарушением однородности стада;
 - ухудшением конверсии корма;
 - риском холангиогепатита.
- Нарушение конверсии корма происходит не только во время инфекции, но и после нее.
- Есть много предрасполагающих факторов, которые имеют значение и которые трудно контролировать:
 - изменения в кишечнике;
 - изменения в иммунной системе;
 - нарушение микробиоты.
- Вакцины отсутствуют.



Эффективное лечение некротического энтерита останавливает болезнь, а значит предотвращает дальнейшие потери.

Healthy livestock





PHENOXYPEN® WSP 325 mg/g

Феноксипен WSP — антибиотик № 1 для лечения некротического энтерита у птиц, вызванного *Clostridium perfringens*

ПРЕИМУЩЕСТВА PHENOXYPEN® WSP:

- Пенициллин узкого спектра действия: высокоэффективен против *Clostridium perfringens*, без существенных нарушений кишечной флоры
- Быстрое растворение и стабильность в питьевой воде
- Оптимальная и быстрая эффективность:
 - стабилен в кислой среде
 - применяется выпаивкой
 - вся доза достигает кишечника и действует непосредственно там, где это необходимо
 - очень низкий MIC (<0,001 мг/мл)
 - максимальная концентрация в плазме достигается в течение 2-х часов
- Высокий терапевтический индекс, что полезно для группового лечения
- 68,6% поглощается, оставляя 31,4% непосредственно в кишечнике для борьбы с *Clostridium perfringens*
- Период вывода: мясо и субпродукты 2 дня, яйца 0 дней

СОСТАВ

1,0 г препарата содержится феноксиметилпенициллин калия 325 мг и наполнитель до 1,0 г

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Феноксиметилпенициллин (пенициллин V) является бета-лактамым антибиотиком с активностью в отношении грамположительных и некоторых грамотрицательных бактерий, в т.ч.: *Clostridium spp.*, *Streptococcus spp.*, *Staphylococcus spp.*, *Haemophilus spp.*, *Pasteurella spp.*, *Bordetella spp.* и др.

Механизм действия связан с ингибированием фермента транспептидазы катализирующим взаимосвязь между полимерными звеньями гликопептидов, которые формируют клеточную стенку бактерий, что приводит к гибели бактерии в результате осмотического лизиса.

После перорального применения препарат хорошо распределяется в большинстве тканей, что приводит к его высокой концентрации в почках и печени. Феноксиметилпенициллин частично разлагается в желудочно-кишечном тракте. Небольшая часть абсорбированного препарата метаболизируется в организме. В основном, препарат выводится из организма с мочой и фекалиями.

ПОКАЗАНИЯ

Препарат назначают птице (цыплята-бройлеры, ремонтный молодняк кур-несушек, индейки) для профилактики и лечения бактериальных заболеваний, вызванных микроорганизмами, чувствительными к феноксиметилпенициллину, в том числе: некротического энтерита, вызванного *Clostridium perfringens*, стрептококкоза и стафилококкоза.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ

Препарат применяют птице орально с питьевой водой в дозе 500 г на 1000 литров воды (10–20 мг феноксиметилпенициллина на кг массы тела), в течение 5 дней. В период лечения птица должна получать только воду, содержащую препарат. Приготовленный раствор препарата необходимо использовать в течение 12 ч.

ФОРМА ВЫПУСКА

Герметичные полимерные пакеты, упакованные в картонные коробки с защитным слоем алюминиевой фольги по 250 г, 1000 г и 5000 г

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

Dopharma B.V., Zalmweg 24, 4941 VX Raamsdonkveer, Нидерланды



Официальный дистрибьютор в России:
ООО «Симедика РУ», тел. +7 (495) 9430067
www.cymedica.com