



НАЙКРАЩЕ РІШЕННЯ — ЦЕ ПРОФІЛАКТИКА

Трахеобронхіт – хвороба виліковна. У більшості випадків собаки потребують 10-денного курсу лікування антибіотиками, а вже повноцінне одужання може тривати до 6 тижнів. Однак, дуже часто хвороба ускладнюється і може потребувати додаткового лікування. Якщо собака захворів на інфекційний трахеобронхіт – лікування вимагатиме часу, буде складним та витратним. Звичайно, краще рішення – це профілактика.

Запитайте у свого ветеринарного лікаря про інтраназальну вакцину Nobivac® KC вже сьогодні.

Проста інтраназальна вакцинація може стимулювати імунітет до *Bordetella bronchiseptica* та вірусу парагрипу собак – двох основних причин трахеобронхіту. Вакцинація починає діяти вже через 3 дні після введення лише однієї краплі у ніс Вашого собаки, і забезпечує неперервний захист протягом 12 місяців – у будь-який час і будь-де.

Профілактика захворювання ефективніша і доцільніша за лікування.

Nobivac 
Надійний захист найцінніших стосунків



Реєстраційне посвідчення № BA-00234-02-10.

Nobivac® KC — жива ліфіолізована комбінована вакцина проти бордетеліозу та парагрипу собак.

Офіційний дистриб'ютор
в Україні: ТОВ «Симедіка УА»
7, Кудрявський узвіз, м. Київ,
Україна, 04053
+38 (044) 451 88 61
www.cymedica.com
Ліцензія АВ № 613395 від 28.03.2012р.



Представництво Інтервет
Ейдженс Б. В. в Україні
03680, Україна, м. Київ,
вул. Амосова, 12, 3-й поверх
БЦ «Горизонт Парк»
Тел.: +38 (044) 393 74 60,
факс: +38 (044) 393 74 91



Захистіть свого собаку від трахеобронхіту!



РИЗИК ІСНУЄ МАЙЖЕ ВСЮДИ— ВІД ПАРКІВ ДО ВЕТЕРИНАРНИХ КЛІНІК

Соціальна природа собак завжди спонукає їх близько контактувати з іншими собаками. Тому ризик інфекційного трахеобронхіту постає перед багатьма собаками всюди, де вони вступають у контакт із оточуючим світом. Інфекція може передаватися між собаками через повітря, через безпосередній контакт із інфікованим собакою чи непрямий контакт із забрудненими об'єктами, наприклад, через іграшки чи миски собак.

Не є виключенням можливість інфікування у більш розповсюджених місцях соціальної взаємодії собак, таких як:

- парки;
- виставки;
- тренування;
- прогулянки;
- ветеринарні лікарні;
- грумінг-салони.



ВИСНАЖЛИВЕ ЗАХВОРЮВАННЯ, НА ЯКЕ СОБАКА МОЖЕ ЗАХВОРІТИ БУДЬ-ДЕ

Інфекційний трахеобронхіт собак, що оманливо поширений під назвою «розплідниковий кашель», є дуже контагіозним респіраторним захворюванням. Правда в тому, що Ваш собака може захворіти у багатьох інших місцях, окрім розплідника, і це може відбутися будь-коли.

Інфекційний трахеобронхіт може:

- уражати собак усіх вікових груп;
- проявлятися у вигляді нападів жорсткого сухого кашлю;
- тривати протягом декількох тижнів;
- переходити у пневмонію;
- бути летальним при ускладненнях у цуценят та собак старшого віку.

Інфекційний трахеобронхіт легко передається і може спричинити те, що соціально активні у повсякденному житті собаки тижнями страждатимуть від жакливого кашлю, якщо їх вчасно не вакцинувати.