

Jediný přípravek na otitis externa,
který se aplikuje tak snadno jako
tekutina, a na místě účinku tvoří gel.

Je aktivní tam, kde je to potřeba.¹



Osurnia®
Jsme jedno velké ucho



Je známo, že otitis externa se řadí k častým problémům ve veterinární praxi. Infekční záněty uší patří mezi nejběžnější důvody, proč majitelé přichází se psy na kliniku², přičemž někdy se jedná o náročné až frustrující případy.

Volba přípravku ve formě gelu, který účinkuje tam, kde je potřeba, přispívá k úspěšnému výsledku léčby.*



- ✓ **Jedinečná receptura ve formě gelu**
- ✓ **Léčba otitidy ve dvou dávkách s odstupem 7 dnů**
- ✓ **Majitelé psů se musí vrátit na praxi pro druhou aplikaci přípravku**

Patentovaná receptura ve formě gelu

Osumnia představuje unikátní přípravek vyrobený ve formě, která v uchu přetrvává. Lze ji snadno podávat, stačí z tuby vymáčknout gel, který se aplikuje podobně jako tekutina, takže se rozšíří po celé ploše zvukovodu. Pak podaný gel vytváří vrstvu pokrývající výstelku ucha, což má za následek dlouhodobý kontakt účinných látek přípravku s kůží na místě infekce¹. Možnost selhání léčby je proto zanedbatelná.



Osumnia funguje v souladu s přirozeným procesem čištění ucha. Rozprostírá se po celé ploše zvukovodu, rozpouští se v ušním mazu a postupně se vylučuje procesem migrace epitelu.

Osumnia[®] působí na místě infekce pomocí tří účinných látek²



Antibiotikum florfenicol
účinné proti
S. Pseudintermedius



Antimykotikum terbinafin
účinné proti
Malassezia spp.



**Antiinflammatorikum
betametazon acetát,**
působí proti zánětu a pruritu

Jemná plikace u psů s bolestivými ušima


Osrnia je k dispozici v jednodávkových tubách s pružnou měkkou špičkou a předem odměřeným množstvím přípravku, takže psi pokaždé dostanou správnou dávku bez nepříjemné aplikace.

Správná aplikace Osrnie:

- Před léčbou je třeba zvukovod vyčistit a vysušit.
- Otevřete tubu otočením měkké špičky.
- Zaved'te pružnou špičku do zvukovodu postiženého ucha.
- Vytlačte celý obsah tuby do infikovaného zvukovodu.
- Po aplikaci opatrně masírujte bázi ucha tak, aby se gel dostal do hlubších částí zvukovodu.

Léčbu je nutno zopakovat po 7 dnech, ale před podáním druhé dávky už ucho nesmíme čistit, protože odstraněním gelu bychom znehodnotili jeho působení.

Infikované ucho



Léčba přípravkem Osrnia znamená, že se klienti musí na Vaši praxi vrátit.

Úspěšná terapie zánětu vnějšího zvukovodu často představuje dlouhodobou, nebo dokonce celoživotní, péči o pacienta. K tomu je potřeba nemalé odhodlání majitele, a také dobrý vztah mezi veterinářem a majitelem.

Když je nutno léčit otitidu* u psa, přináší Osrnia velkou dávku jistoty.

Léčba přípravkem Osrnia umožňuje veterinářům převzít kontrolu nad pacientem a zlepšit komplianci. Nutnost podat druhou dávku přípravku poskytuje příležitost zkontrolovat stav pacienta uprostřed léčby, jestli vše probíhá jak má. Zároveň je to příležitost, kdy majitel musí opět přijít na praxi a tak se zvyšuje důvěra a posiluje vztah mezi veterinářem a klientem.

**První
dávka**

den 0

**Druhá
dávka**

den 7

Pokračující účinek

Cymedica disponuje celou řadou produktů, které pomáhají veterinářům při léčbě a dlouhodobé péči o pacienty s otitidou. V rámci našeho portfolia jsme schopni Vám nabídnout nejlepší léčbu pro malá zvířata s ohledem na Vaše klinické požadavky i životní styl majitele.

Více informací najdete na stránkách www.cymedica.com





Reference

1. T. Nuttall and S. Forster, Terbinafine and florfenicol concentrations in the canine ear exceed minimum inhibitory concentrations for common otic pathogens after treatments with Osrurnia® (Elanco Animal Health), British Veterinary Dermatology Study Group, April 2015
2. O'Neill *et al* (2014) Prevalence of disorders recorded in dogs attending primary-care veterinary practices in England. PLoS ONE **9**(3) e90501

*Léčba akutního zánětu vnějšího zvukovodu a akutních exacerbací recidivujících zánětů vnějšího zvukovodu souvisejících se *Staphylococcus pseudintermedius* a *Malassezia pachydermatis* u psů.

Osrurnia obsahuje: terbinafin 10 mg, florfenikol 10 mg, betametazon acetát: 1 mg je ekvivalentní bázi betametazonu 0,9 mg

Cymedica CZ, a.s. | Pod Nádražím 308 | CZ 268 01 Hořovice
tel.: +420 311 706 211 | e-mail: info@cymedica.cz
www.cymedica.com


Dechra
Veterinary Products