



Поради щодо застосування Алізин 30 мг/мл

- ✓ Є найкращим рішенням, якщо з моменту в'язки пройшло не більше 45 днів
- ✓ Якщо тварина все ще в еструсі:
 - ♦ *порадьте власнику уникати подальших спаровувань після лікування*
 - ♦ *або зачекайте до кінця періоду еструсу, щоб розпочати застосування препарату*
- ✓ Для розрахунку точної дози препарату треба знати точну вагу тварини
- ✓ **Необхідно вводити 0,33 мл Алізин 30 мг/мл на кожен кілограм ваги/добу (тобто 10 мг аглепрістону/кг/добу), курс 2 ін'єкції**
- ✓ Між двома ін'єкціями дотримуватись інтервалу у 24 години
- ✓ Ін'єкцію робити підшкірно на рівні **шийно-грудного відділу**
- ✓ Після введення рекомендується **легкий масаж** у місці ін'єкції, щоб зменшити місцеву реакцію. Слід змінювати сторону місця ін'єкції
- ✓ Крім того, дози більше 5 мл слід розділяти порівну і вводити в різних місцях
- ✓ Заплануйте повторний візит із власником для подальшого лікування і для підтвердження переривання вагітності за допомогою ультразвукового обстеження:
 - ♦ *При перериванні вагітності на ранніх термінах: через 20 днів після застосування*
 - ♦ *При перериванні вагітності на середніх термінах: через 8 днів після застосування*
- ✓ У разі невдачі (менше 5% випадків) можна повторити лікування (2 ін'єкції із інтервалом 24 години по 0,33 мл Алізин 30 мг/мл на кожен кілограм ваги/добу), якщо вагітність не досягла більше 45 днів.



ОФІЦІЙНИЙ ДИСТРИБ'ЮТОР В УКРАЇНІ: ТОВ «СИМЕДІКА УА»
7, Кудрявський узвіз, Київ, Україна, 04053
+38 (044) 451 88 61 | www.cymedica.com
Ліцензія АВ № 613395 від 28.03.2012 р.



АЛІЗИН® 30 мг/мл

VJE 365

20130112001

Map 3
170dB/C 3
Persist Low
2D Opt:Res
Col 82% Map 1
WF Med
PRF 1500 Hz
Flow Opt: Med V

**НОВЕ
РІШЕННЯ
В РЕПРОДУКЦІЇ
СОБАК**




Virbac



Алізин 30 мг/мл — оригінальний спосіб дії


Аглерістон протидіє активності, пов'язаній з прогестероном



- Антигормон, що блокує рецептори прогестерону
- Афіність у 3 рази вища, ніж у прогестерону
- Не викликає гормонального ефекту

На початку вагітності застосування аглерістону призводить до ембріональної резорбції.

Пізніше під час вагітності аглерістон заважає прогестерону підтримувати визрівання плоду, що призводить до абортів.



Алізин 30 мг/мл — точний інструмент для переривання вагітності у сук

Рекомендований протокол застосування

Дві послідовні дози Алізин 30 мг/мл по 0,33 мл/кг із інтервалом між застосуваннями у 24 години у період між 0 та 45 днями після спарювання.

Кінець еструсу або діагностика вагітності

Наступне клінічне обстеження

D0

D1

D10



Аглерістон

10 мг/кг або 0,33 мл/кг
Алізин 30мг/мл



Аглерістон

10 мг/кг або 0,33 мл/кг
Алізин 30мг/мл

Надзвичайна ефективність

День 0* — День 25:

99% терапевтичного успіху

День 25 — День 55: 95,7% успіху

*D0 — день спарювання




Алізин 30 мг/мл — оптимальний комфорт для пацієнта

На початку переривання вагітності:


- У 8-12% сук можуть спостерігатися легкі серозні виділення, але в більшості випадків власники не помічають явних ознак переривання вагітності

У середині вагітності

- У 33% сук в середині вагітності з'явилися коричневі виділення з вульви через 12–96 годин після початку лікування. У 95,7% досліджених випадків переривання вагітності закінчується видаленням плоду менше ніж за сім днів після першої ін'єкції




Втрата плоду відбувається протягом 7 днів від першої ін'єкції



Алізин 30 мг/мл — високий рівень безпеки

Не призводить до збільшення кількості маткових інфекцій



Не впливає на репродуктивну функцію

Відновлення фізіологічних функцій після лікування відбувається у повній мірі. Немає загрози наступним вагітностям та пологам.

- Затримка повернення в еструс після переривання вагітності може бути зменшена до 1-3 місяців.
- Коефіцієнт фертильності після абортів в першому еструсі становить 86,2%, але повертається до 100% після другого еструсу. Рекомендується почекати другого еструсу, якщо сука має високу репродуктивну цінність.