


## КОЛИ СЛІД РОЗПОЧАТИ ДІАЛОГ ІЗ ВЛАСНИКОМ СОБАКИ?

Ключові часові інтервали для спостереження появи небажаної поведінки



3-4 місяці:  
під час  
вакцинації

чи/  
або

6-10 місяців:  
огляд у період  
статевого дозрівання

Загальний  
огляд/щорічна  
вакцинація

Інформування власника

Час задавати запитання

## ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ



Небажана  
поведінка не  
проявляється

НЕБАЖАНА ПОВЕДІНКА ПРОЯВЛЯЄТЬСЯ

Прийятна

Тест імплантом  
Супрелорін® 4,7 мг

Хірургічна кастрація

Оціночний візит через  
6 місяців

Небажана поведінка все  
ще проявляється



Покращення

Подальші консультації  
щодо зміни поведінки

Варіанти дії

Хірургічна кастрація

Супрелорін® 4,7 мг  
імплант для собак

# Супрелорін®

імплант для собак

## НЕБАЖАНА ПОВЕДІНКА У СОБАК-САМЦІВ



## ЧИ ПОВ'ЯЗАНА ВОНА ІЗ ТЕСТОСТЕРОНОМ?



Імплант Супрелорін®  
дає змогу отримати ефект  
від зниження тестостерону  
без незворотних наслідків




ОФІЦІЙНИЙ ДИСТРИБ'ЮТОР В УКРАЇНІ ТОВ «СИМЕДІКА УА»  
7, Кудрявський узвіз, Київ, Україна, 04053  
+38 (044) 451 88 61 | www.cymedica.com  
Ліцензія АВ № 613395 від 28.03.2012 р.

Virbac

Shaping the future of animal health

## НЕБАЖАНА ПОВЕДІНКА?



### ДОСЛІДЖЕННЯ СЕРЕД 366 ВЛАСНИКІВ СОБАК-САМЦІВ ПОКАЗАЛИ:

- 2 власника із 3 стикаються щонайменше із одним поведінковим розладом із 4 зазначених у свого некастрованого пса. 33% власників збентежені такою поведінкою.
- 3 власника із 4 не розповідають про небажану поведінку своєму ветеринарному лікарю.



## ЧОМУ?

- Деякі власники вірять, що таку поведінку змінити неможливо.
- Більшість із них просто ігнорують таку поведінку.



## ЧОТИРИ ПРОСТІ ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ПОЧАТКУ ДІАЛОГУ ІЗ ВЛАСНИКОМ?



Собака намагається спарюватись із живими та неживими предметами?



Чи занадто агресивно Ваш собака поводить себе із іншими собаками?



Чи втікає Ваш собака та його важко повернути?



Чи мітить Ваш собака територію занадто активно?

Відповідь «ТАК» хоча б на одне запитання може свідчити про вплив тестостерону на поведінку собаки

## КАСТРАЦІЯ МОЖЕ ЗНИЗИТИ ЧАСТОТУ ПРОЯВІВ НЕБАЖАНОЇ ПОВЕДІНКИ

### Після хірургічної кастрації

Прояви небажаної поведінки зменшуються приблизно у 60% собак

Ніяк не впливає на поведінку собак у 40% собак



Оцінка впливу тестостерону на небажану поведінку конкретного собаки є вкрай необхідним



## МЕХАНІЗМ ДІЇ ІМПЛАНТУ СЕПРЕЛОРІН®

### ДЕСЛОРЕЛІН



Зниження чутливості рецепторів GnRH суперагоністом деслореліном

Зменшення синтезу і вивільнення FSH і LH

ЗМЕНШЕНИЙ РІВЕНЬ ТЕСТОСТЕРОНУ

ВАЖЛИВО ПОПЕРЕДИТИ ВЛАСНИКІВ СОБАК ПРО ПОЧАТКОВИЙ ЕФЕКТ У ВИГЛЯДІ ПОВЕДІНКОВОГО СПАЛАХУ

Загострення поведінки, пов'язаної з тестостероном:

- У певний початковий період після імплантації поведінка відрізнятиметься від остаточної поведінки
- За необхідності собаку необхідно відокремити від сук в еструсі або інших собак-самців

ЕФЕКТ СПАЛАХУ ТРИВАЄ ПЕРШІ 2-3 ТИЖНІ, СТЕРИЛЬНІСТЬ НАСТАЄ МАКСИМУМ ЧЕРЕЗ 6 ТИЖНІВ