


Зручність та безпечність
при застосуванні



Золетил 100
Ін'екційний анестетик

Virbac

ЗОЛАЗЕПАМ

Похідне бензодіазепіну



ТІЛЕТАМІН

Дисоціативний анестетик

Розслаблення м'язів
Сedaція
Протисудомний ефект

Непритомність
Знеболення

Рівна пропорція
▶ Ефективний загальний анестезуючий ефект

НЕПРИТОМНІСТЬ

МІОРЕЛАКСАЦІЯ

БЕЗПЕЧНІСТЬ

ЗНЕБОЛЕННЯ



ЗРУЧНІСТЬ


- Швидкий початок хірургічної анестезії
 - Внутрішньовенно (ВВ) – 1 хвилина
 - Внутрішньом'язово (ВМ) – 3-6 хвилин
- Знеболення
 - Соматичний і вісцеральний біль
 - Достатня дія для легкого та помірного болю
 - Зменшення гіпералгезії після травм тканин
- Міорелаксація
 - Золазепам діє на центральні та периферичні бензодіазепінові рецептори

ГНУЧКІСТЬ У ЗАСТОСУВАННІ

- Багатоцільовий – від легкої до повної хірургічної анестезії
- Варіанти введення: ВМ, ВВ, ІПШ
- Ефективно діє як на собак, так і на котів

БЕЗПЕКА

- Обмежений побічний ефект при застосуванні рекомендованих доз
- Відсутність кардіодепресії
- Відсутність печінкової або ниркової токсичності
- Суттєвий запас безпечності



Терапевтичний індекс «Золетил 100» у собак та котів

Коротка довідка із застосування



Золетил 100

Порошок із розчинником для ін'єкційного застосування
Знеболюючий засіб для собак і котів

ПОКАЗАННЯ

Знеболення або седация собак і котів для обстеження або операції.

СКЛАД

Кожен флакон Золетил 100 містить:

- Тілетамін 250 мг
- Золазепам 250 мг

ЗБЕРІГАННЯ

- У сухому вигляді термін придатності становить 2 роки при 20 °C (+/- 5 °C).
- Після розведення розчин потрібно зберігати при температурі 4 °C максимум 8 днів.
- Не тримати під впливом світла.

ПРОТИПОКАЗАННЯ

- Епілептичні судоми
- Внутрішньочерепна гіпертензія (гідроцефалія, черепно-мозкова травма)
- Артеріальна гіпертензія

ДОЗУВАННЯ ТА ВКАЗІВКИ ДО ЗАСТОСУВАННЯ

Розведення:

Розчиніть стерильний порошок у 5 мл стерильної води і добре перемішайте. Проконтролюйте повне розчинення перед використанням.

Дозування:

- Дози гнучкі з урахуванням стану пацієнта. Фактори, що впливають на реакцію, включають: вік, супутні захворювання.
- У геріатричних та ослаблених пацієнтів слід зменшити дозу.

СОБАКИ	Премедикація (ВМ застосування)*	Індукція (ВВ застосування)*
Спокійний собака	3 мг/кг	0,5-2 мг/кг (болюс) або 0,5-2 мг/кг/год (ІПШ)
Агресивний собака	4 мг/кг	

КОТИ	Премедикація (ВМ застосування)*	Індукція (ВВ застосування)*
Спокійна кішка	1-2 мг/кг	0,5-2 мг/кг (болюс) або 0,5-2 мг/кг/год (ІПШ)
Збуджена кішка	2-3 мг/кг	

* - дози можуть бути зменшені при одночасному застосуванні з альфа-2 агоністами.

За необхідності повторного введення препарату дозу зменшують на 1/3-1/2 від початкової. Визначення відповідної дози залежить від виду тварини, її стану (вік, вага, вгодованість, виражена недостатність органів, стан тварини, період вагітності) та типу операції.

Пробудження:

- Пробудження проходить протягом 1-5,5 годин у тихому темному місці.
- Відновлення може бути довшим у випадках передозування, багаторазового введення, у тварин із надмірною вагою, старих тварин, тварин із порушенням функції печінки та нирок.
- Під час пробудження може спостерігатись збудження тварини, яке можна нівелювати введенням альфа-2 агоністів.

Застереження:

- Бажано утримати тварину від їжі за 4-8 годин до застосування. При маніпуляціях на ЖКТ — за 12 годин.
- Слід контролювати температуру тіла, а тварин слід убезпечити від втрати тепла під час анестезії.
- Очі зазвичай залишаються відкритими з розширеними зіницями. Застосування офтальмологічної мазі доцільне для захисту рогівки від висихання.

ПОБІЧНІ ЕФЕКТИ ТА СПЕЦІАЛЬНІ ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ

- «Золетил 100» має суттєвий запас безпечності для котів та собак.
- Побічні ефекти залежать від індивідуальної реакції, що включає надмірне слиновиділення, надмірні виділення із трахеї та бронхів, вокалізацію та блювання під час відновлення, м'язові рефлексії та ригідність, тимчасові апное та тахікардія.
- У разі кесаревого розтину «Золетил 100» проникає через плацентарний бар'єр і викликає часткову анестезію та незначну дихальну депресію у новонароджених.
- Може викликати підвищення тиску.

ВЗАЄМОДІЯ З ІНШИМИ ЛІКАМИ

- Не застосовувати препарат одночасно з хлорамфеніколом через сповільнення виведення анестетика.
- Не використовуйте спільно із препаратами групи фенотазинів (ацепромазин, хлорпромазин) через ризик розвитку серцевої та дихальної недостатності та гіпотермії.
- Поєднання «Золетил 100» із $\alpha 2$ -агоністами та опіоїдами покращує його ефективність та зменшує ризики побічних реакцій. При цьому дозування препаратів слід скорегувати.
- При гіперсалівації слід розглянути використання атропіну за умови відсутності у пацієнта тахікардії.

ТОВ «СИМЕДІКА УА»

7, Кудрявський узвіз, Київ,
Україна, 04053
+38 (044) 451 88 61
www.cymedica.com

