

Rad produktov

EQUIPALAZONE®

Komplexný program na liečbu bolesti koní



NAJNOVŠIE
v ponuke
Spoločnosti


Dechra
Veterinary Products


NOVO zastúpené v SR
prostredníctvom

 **Cymedica**

3 dôvody prečo je EQUIPALAZONE® číslo 1

1 Technológia MICROCAPS®

EQUIPALAZONE® prášok **zvyšuje svoju chuťnosť** pomocou technológie Microcaps® – unikátnemu potiahnutiu arabskou gumou, pomocou čoho dochádza k mikroenkapsulácii každej granuly fenylbutazónu. Toto „mikro“ potiahnutie minimalizuje objem a je dôvodom, prečo je EQUIPALAZONE® prášok k dispozícii v **úsporných škatulkách** a **kompaktných vrecúškach**, ktoré je možné **ľahko oddeliť** a **použiť**.



	EQUIPALAZONE® prášok	Prípravok s úč. látkou suxibuzón
Spôsob výroby	Mikroenkapsulácia	Mikroenkapsulácia
Hmotnosť vrecúška	<p>■ Hmotnosť účinnej zložky</p> <p>■ Hmotnosť základu prípravku</p>	
Celková hmotnosť vrecúška	1,5 g	10 g
Veľkosť škatulky	75 mm x 85 mm x 180 mm	85 mm x 105 mm x 360 mm
Rozdelenie dávok		
Vrecúška k dispozícii	25 prúžkov po 4	60 samostatných vrecúšok

*Metabolizuje sa na 1 g fenylbutazónu. ¹ Veterinary Pharmacology and Therapeutics (2001). Ed. H. Richard Adams, 436. Technológia MICROCAPS® je registrovaná ochranná známka spoločnosti Eurand.

2 EQUIPALAZONE® je chutnejší

Nová skrížená klinická štúdia zahŕňajúca 3 periódy a 3 prípravky preukázala, že EQUIPALAZONE® prášok je **rovnako chutný alebo chutnejší** v porovnaní s prípravkom na báze suxibuzónu a prípravkom na báze fenylbutazónu bez enkapsulácie¹, ktorý je registrovaný vo Veľkej Británii.


Založené na priemere zahŕňajúceho 3 dni:

- Podiel skonzumovaného jadra bol nižší, keď bol na povrch krmiva aplikovaný prípravok na báze fenylbutazónu bez enkapsulácie¹, a to v porovnaní buď s prípravkom EQUIPALAZONE®, alebo prípravkom na báze suxibuzónu. Rozdiel bol štatisticky významný.
- Nebol zistený štatisticky významný rozdiel v skonzumovanom množstve medzi prípravkom EQUIPALAZONE® a prípravkom na báze suxibuzónu.

Percento skonzumovaného jadra

$$\frac{\text{Množstvo podaného krmiva} - \text{množstvo zvyšného krmiva}}{\text{Množstvo podaného krmiva}} = \frac{\text{skonzumované množstvo}}{\text{Množstvo podaného krmiva}} \times 100 = \% \text{ skonzumovaného jadra}$$

Percento skonzumovaného jadra



■ Percento skonzumovaného jadra – 3 dňový priemer
* Rozdiel bol štatisticky významný, P < 0,05

¹ Dechra Veterinary Products internal report PAL001.


Subjektívne hodnotenie chutnosti

Na základe 3 dňového mediánu:

- Bola pozorovaná nižšia chutnosť produktu na báze fenylobutazónu bez enkapsulácie v porovnaní buď s prípravkom EQUIPALAZONE®, alebo prípravkom na báze suxibuzónu. Rozdiel bol štatisticky významný.
- Nebol zistený štatisticky významný rozdiel v sledovanej chutnosti medzi prípravkom EQUIPALAZONE® a prípravkom na báze suxibuzónu.

S touto znalosťou môžu veterinári a majitelia **s istotou dôverovať** prípravku EQUIPALAZONE® – znovu a znovu.

CHUTNOSŤ	
SKÓRE	POZOROVANIA
0	Nie je chutné
1	Mierne chutné
2	Chutné



subjektívne skóre chutnosti – 3 dňový medián

* Rozdiel bol štatisticky významný, $P < 0,05$

EQUIPALAZONE® – fenylobutazon číslo 1 po 35 rokoch

- Vyrába a predáva spoločnosť DECHRA – **uznávaný líder** v oblasti liečiv pre kone.
- Ako prvá prináša na trh **fenylobutazón upravený mikroenkapsuláciou**.
- V priebehu posledných 35 rokov **predaných viac ako 100 miliónov vrecúšok**.
- Neustále **zlepšovanie a rozširovanie** nášho sortimentu prípravkov a služieb.



List údajov o prípravku

Lieková forma:

Sypký biely/krémový **prášok na perorálne podanie**, obsahujúci **1 g mikroenkapsulovaného fenylobutazónu** v každom vrecúšku. Konzervačná látka: sodium paracombin 0,15 % w/w

Indikácie:

Equipalazone® 1 g perorálny prášok je určený na **liečbu porúch pohybového aparátu pri koňoch a poníkoch**, kedy môžu protizápalové a analgetické vlastnosti fenylobutazónu poskytnúť úľavu. Medzi stavy, ktoré sa obvykle považujú za vhodné na liečbu fenylobutazónom, patria napríklad krívanie spojené s osteoartritickými stavmi, akútne a chronické krívanie, burzitída a karpitída a na zníženie reakcie mäkkých tkanív po operácii.

Dávkovanie a spôsob podania:

Kone 450 kg ž.hm.: obsah dvoch vreciek podať dvakrát v 1. deň liečby (čo zodpovedá 8,8 mg/kg/deň), následne jedno vrecko dvakrát denne počas štyroch dní (4,4 mg/kg/deň), potom jedno vrecko denne alebo každý druhý deň, čo postačí udržať koňa pokojného (2,2 mg/kg/denne);

Poníky 225 kg ž.hm.: jedno vrecko (4,4 mg/kg) každý druhý deň. Dávkovanie prispôbte aktuálnej hmotnosti zvieraťa.

Ukončíte liečbu, ak sa účinok liečby nedostaví v priebehu 4 až 5 dní. Na ľahšie podanie zamiešajte Equipalazone® 1 g perorálneho prášku do malého množstva krmiva (napr. otrúb alebo ovsu).

Kontraindikácie:

Terapeutický index fenylobutazónu je nízky. Neprekračujte uvedené dávkovanie ani trvanie liečby. Nepodávať súčasne s inými nesteroidnými protizápalovými liekmi (NSAID) ani v odstupe 24 hodín. Nepoužívať pri zvieratách trpiacich na ochorenia srdca, pečene alebo obličiek, v prípade novej gastrointestinálnej ulcerácie alebo krvácania prípadne pri preukázanej krvnej dyskrázii. Nepoužívať v prípade známej precitlivosti na účinnú látku alebo na alebo na niektorú z pomocných látok.

Ďalšie upozornenia:

Niektoré nesteroidné protizápalové lieky sa môžu silne viazať na plazmatické bielkoviny a pôsobiť tak konkurenčne voči iným liečivám s rovnakou vlastnosťou. Výsledkom môže byť zvýšenie farmakologicky účinných koncentrácií voľného liečiva, čo môže viesť k toxickým účinkom.

Použitie pri zvieratách vo veku do 6 týždňov a pri starých jedincoch môže vyvolať ďalšie riziká. Ak sa podaniu nemôžeme vyhnúť, dávkovanie by malo byť znížené a zdravotný stav zvierat by mal byť sledovaný.

Nepodávajte dehydratovaným, hypovolemickým a hypotenzným zvieratám z dôvodu zvýšeného rizika zlyhania obličiek. Je potrebné sa vyhnúť súčasnému podávaniu potenciálne nefrotoxických liekov.

Neodporúča sa používať nesteroidné protizápalové lieky, ktoré inhibujú syntézu prostaglandínov, pri zvieratách v celkovej narkóze až do jej úplného odoznenia.

Je potrebné sa vyhnúť použitiu fenylobutazónu počas gravidity, ak je to možné, najmä v prvom trimestri.

Reakcie na dlhodobú terapiu je potrebné monitorovať v pravidelných intervaloch veterinárnym lekárom.

Kôň ošetrovaný týmto prípravkom nesmie byť už nikdy určený na ľudský konzum.



Farmakoterapeutická skupina:

Protizápalové a protireumatické lieky, nesteroidné.

Upozornenie pre osoby podávajúce prípravok zvieratám:

S prípravkom je potrebné vždy zaobchádzať opatrne, aby sa predišlo náhodnému požitiu, styku s pokožkou alebo inhalácii.

V prípade náhodného kontaktu s pokožkou alebo vniknutiu do oka je potrebné zasiahnuté miesto ihneď opláchnuť vodou.

V prípade náhodného požitia vyhľadajte ihneď lekársku pomoc a ukážte písomnú informáciu alebo etiketu prípravku praktickému lekárovi.

Odporúčanie lekárovi: Výplach žalúdka (vomitus u detí) je potrebné vykonať okamžite. Vhodná je aplikácia živočíšneho uhlia. Ďalej sa odporúča symptomatická liečba.

Farmaceutická opatrenia:

Uchovávať na suchom mieste. Uchovávať pri teplote do 25 °C. Každý nepoužitý veterinárny liek alebo odpadové materiály z tohto veterinárneho lieku musia byť zlikvidované v súlade s miestnymi požiadavkami.

Všeobecné opatrenia:

Uchovávať mimo dosahu a dohľadu detí. Len na podanie zvieratám. Nesteroidné protizápalové lieky inhibujú fagocytózu, preto v prípade bakteriálneho zápalu je potrebné liečbu doplniť o zodpovedajúce antibiotiká.

Zákonné kategórie:

Výdaj lieku je viazaný na veterinárny predpis.

Veľkosť balení:

Škatulky obsahujúce 32 alebo 100 vrecúšok.

Ďalšie informácie:

Klinický účinok liečby fenylobutazónom pretrváva po dobu minimálne 3 nasledujúcich dní od ukončenia podávania. To je potrebné mať na pamäti pri vyšetrení zdravotného stavu koňa.

Niektoré organizácie (vr. Jockey Clubu) považujú fenylobutazón za „nepovolenú látku“ z pohľadu dostihového. Preto je možné tento prípravok pri dostihových koňoch použiť len v súlade s odporúčaním zodpovedajúcich dostihových orgánov.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii:

Dechra Regulatory B.V., Handelsweg 25, 5531 AE Bladel, Holandsko
Dechra Limited, Dechra House, Jamage Industrial Estate, Talke Pits, Stoke-on-Trent, Staffordshire, ST7 1XW, UK.

Ďalšie informácie k dispozícii na vyžiadanie.