

Sedatívum z pre mačky a psy

Veterinary Products

SEDATOR® 1mg/ml injekčný roztok pre mačky a psy

Účinná látka: **medetomidinhydrochlorid** (1 mg v 1 ml)

Forma: injekčný roztok bez farby a zápachu

Charakteristika: **sedatívum s analgetickým a myorelaxačným účinkom pre psy a mačky**

Použitie:

- Psy a mačky: **sedácia a analgézia** na uľahčenie manipulácie, pri vyšetrení a pri drobných chirurgických zákrokoch (možná kombinácia s butorfanolom)
- **premedikácia** pred celkovou anestéziou (thiopental, halotan, propofol)
- Mačky: **na celkovú anestéziu s ketamínom** (možná kombinácia s butorfanolom)

Odporúčanie: podávať len zvieratám po 12 hodinovej hladovke

Spôsob podania:

Psy: intramuskulárna i.m. alebo intravenózna i.v. injekcia

Mačky: intramuskulárna i.m. injekcia

Dávkovanie **pri premedikácii**

Psy: 0,01 ml/kg ž.hm i.v. – 0,04 ml/kg ž.hm i.m.

Mačky: 0,05 ml/kg ž.hm i.v. – 0,15 ml/kg ž.hm i.m.

Dávkovanie **pri sedácii** – je vyššie, vid. SPC

Rýchla absorpcia (15-20 min), vylučovaný močom

Zrušenie sedácie: ATIPAM® (pri psoch rovnaký objem ako SEDATOR®, pri mačkách ½ množstva)

POZOR: prípravok spôsobuje hypotermiu, bradykardiu, mydriázu a zníženie salivácie a črevnej motility.

Poznámka: analgetické účinky medetomidínu nie sú dostatočné počas celého času zákroku (je vhodná kombinácia so silnejším analgetikom).

Balenie pre CZ/SK: **10 ml**

Čas použiteľnosti: 3 roky, po otvorení 28 dní

POM-V Len na lekársky predpis - veterinárny liek



ATIPAM® 5 mg/ml injekčný roztok pre mačky a psy

Účinná látka: **atipamezolhydrochlorid** (5 mg v 1 ml)

Forma: injekčný roztok bez farby a zápachu

Charakteristika: selektívny α 2-antagonista (blokátor α 2 receptorov), určený na **zrušenie sedatívnych účinkov medetomidínu a dexmedetomidínu pri mačkách a psoch**.

Spôsob podania: jednorazová intramuskulárna i.m. injekcia cca 15-60 minút po aplikácii (dex)medetomidínu

Dávkovanie:

- Psy: 0,04 ml/kg ž.hm (200 μ g/kg ž.hm.) = 5 násobok dávky medetomidínu alebo 10 násobok dávky dexmedetomidínu
- Mačky: 0,04 ml/kg ž.hm (200 μ g/kg ž.hm.) = 2,5 násobok dávky medetomidínu alebo 5 násobok dávky dexmedetomidínu

Rýchla absorpcia (10-15 min), vylučovaný močom

Balenie pre CZ/SK: **10 ml**

Čas použiteľnosti: 3 roky, po otvorení 28 dní

POM-V Len na lekársky predpis - veterinárny liek



Sedatívum z pre kone a hovädzí dobytok

DOMIDINE® 10 mg/ml inj. roztok pre kone a hovädzí dobytok

Účinná látka: **detomidinhydrochlorid** (10 mg v 1 ml)

Forma: injekčný roztok bez farby a zápachu

Charakteristika: **sedatívum a analgetikum pre kone a hovädzí dobytok**

Použitie:

- **vyšetrenie** (napr. endoskopia, rektálne a gynekologické vyšetrenia, RTG)
- **menšie chirurgické zákroky** (napr. ošetrovanie rán, zubov, šliach, ošetrovanie vemena)
- **pred liečbou a medikáciou** (napr. žalúdočnej sondy, podkúvanie koní)

Odporúčanie: podávať len zvieratám po 12 hodinovej hladovke.

Spôsob podania: intravenózna i.v. alebo intramuskulárna i.m. injekcia

Dávkovanie:

Lahká sedácia 10-20 µg/kg ž.hm = 0,1-0,2 ml/100 kg

Stredná sedácia 20-40 µg/kg ž.hm = 0,2-0,4 ml/100 kg

Dlhodobá sedácia 40-80 µg/kg ž.hm

Rýchla absorpcia (15-30 min), vylučovaný močom a výkalmi (malé množstvo mliekom a slinami) = **ochranné lehoty** (mlieko 12 h, mäso 2 dni)

POZOR: nepoužívať v kombinácii s butorfanolom pri koňoch s kolikou a spolu so sulfónamidmi.

Poznámka: analgetické účinky detomidinu nie sú dostatočné počas celého času zákroku (je vhodná kombinácia so silnejším analgetikom alebo lokálnym anestetikom).

Balenie pre CZ/SK: **20 ml**

Čas použiteľnosti: 3 roky, po otvorení 28 dní.

POM-V Len na lekársky predpis - veterinárny liek

