

Sedativum z pro koně a skot

DOMIDINE® 10 mg/ml inj. roztok pro koně a skot

Účinná látka: **detomidin hydrochlorid** (10 mg v 1 ml)

Forma: injekční roztok bez barvy a zápachu

Charakteristika: **sedativum a analgetikum pro koně a skot**

Použití:

- **vyšetření**, (např. endoskopie, rektální a gynekologická vyšetření, RTG)
- **menší chirurgické zásahy** (např. ošetření ran, zubů, šlach, ošetření struků)
- **před léčbou a medikací** (např. žaludeční sonda, kování koní)

Doporučení: používat pouze u zvířat po 12-ti hodinové hladovce

Způsob podání: intravenózní i.v. nebo intramuskulární i.m.injekce

Dávkování :

Lehká sedace	10-20 µg/kg ž.hm = 0,1-0,2 ml/100 kg
Střední sedace	20-40 µg/kg ž.hm = 0,2-0,4 ml/100 kg
Dlouhodobá sedace	40-80 µg/kg ž.hm

Rychlá absorpce (15-30 min), vylučován močí a výkaly (malé množství mlékem a slinami) = **ochranné lhůty** (mléko 12 h, maso 2 dny)

POZOR: nepoužívat v kombinaci s butorfanolem u koní s kolikou a spolu se sulfonamidy

Poznámka: analgetické účinky detomidinu nejsou dostatečné po celou dobu zákroku (je vhodná kombinace se silnějším analgetikem nebo lokálním anestetikem)

Balení pro CZ/SK: **20 ml**

Doba použitelnosti: 3 roky, po otevření 28 dní

POM-V Pouze na lékařský předpis - veterinární přípravek

