

AKCE

SEDATOR[®] a ATIPAM[®]

3+1 nebo 5+2

SEDATOR[®] 1 mg/ml injekční roztok pro psy a kočky

Účinná látka: medetomidin hydrochlorid (1 mg v 1 ml)

Forma: injekční roztok bez barvy a zápachu, balení 10 ml

Charakteristika: sedativum s analgetickým a myorelaxačním účinkem pro psy a kočky



Použití:

• Psi a kočky

- sedace a analgezie pro usnadnění manipulace, pro vyšetření a při drobných chirurgických zákrocích (možná kombinace s butorfanolem)
- premedikace před celkovou anestezí (thiopental, halotan, propofol)

• Kočky

- pro celkovou anestezii s ketaminem (možná kombinace s butorfanolem)

Psi: intramuskulární i.m. nebo intravenózní i.v. injekce

Kočky: intramuskulární i.m. injekce

Rychlá absorpce (15-20 min), vylučován močí

Zrušení sedace: ATIPAM[®]

(u psu stejný objem jako SEDATOR[®],
u koček
½ množství)



ATIPAM® 5 mg/ml injekční roztok pro kočky a psy

Účinná látka: *atipamezol hydrochlorid* (5 mg v 1 ml)

Forma: injekční roztok bez barvy a zápachu, balení 10 ml

Charakteristika: Selektivní 2-antagonista (blokátor 2 receptoru), určen pro zrušení sedativních účinků medetomidinu a dexmedetomidinu u koček a psů

Způsob podání: jednorázová intramuskulární i.m. injekce cca 15-60 minut po aplikaci (dex)medetomidinu



Dávkování:

- **Psi:** 0,04 ml/kg ž.hm (200 µg/kg ž.hm.) = 5-ti násobek dávky medetomidinu nebo 10-ti násobek dávky dexmedetomidinu
- **Kočky:** 0,04 ml/kg ž.hm (200 µg/kg ž.hm) = 2,5 násobek dávky medetomidinu nebo 5ti násobek dávky dexmedetomidinu
- Rychlá absorpce (10-15 min), vylučován močí



V nabídce je také sedativum pro koně a skot **DOMIDINE®**. Jedná se účinnou látku *detomidin hydrochlorid* (10 mg v 1 ml). Produkt je dostupný v balení 20 ml.

Více informací naleznete na www.cymedica.cz v sekci *Produkty*.

 **Cymedica**



Cymedica CZ, a.s., Pod Nádražím 308, 268 01 Hořovice
+420 311 706 21, info@cymedica.cz, www.cymedica.com