

Cardisure®

taktiež ako PERORÁLNY ROZTOK

Novinka



Poskytuje riešenie, keď je podávanie tablet náročné



Kvalitnejšia starostlivosť o kardiologického pacienta


















- Perorálny roztok Cardisure® obsahuje účinnú látku pimobendan.
- Produkt je dostupný v dvoch veľkostiach fľaštičiek: 42 ml a 168 ml s pribalenou dávkovacou striekačkou s objemom 1,5 ml a 3 ml pre ľahké podávanie.
- Koncentrácia účinnej látky je 3,5mg v 1 ml perorálneho roztoku.
- Pridanie perorálnej formy Cardisure® rozširuje možnosti riešenia liečby kardiakov aj pre pacientov, ktorí majú problém s príjmom tablet.




Cardisure®

Dávkovacia tabuľka Cardisure®

Odporúčaná dávka na podanie dvakrát denne*

Hmotnosť psa	Cardisure® tablety a perorálny roztok								
	1.25 mg		2.5 mg		5 mg		10 mg		3.5 mg/ml
5 kg	 1.25 mg	alebo	 ½ 2.5 mg	alebo	 ¼ 5 mg				 0.35 ml
10 kg			 2.5 mg	alebo	 ½ 5 mg	alebo	 ¼ 10 mg		 0.7 ml
15kg					 ¾ 5 mg				 1.1 ml
20kg					 5 mg	alebo	 ½ 10 mg	alebo	 1.4 ml
30kg							 ¾ 10 mg	alebo	 2.1 ml
40kg							 10 mg	alebo	 2.8 ml



Viac informácií o produktoch Cardisure® nájdete na www.cymedica.com alebo po načítaní QR kódu.

Nepotrebovanú rozdelenú tabletu vráťte do blistra a spotrebujte do 3 dní.

Dávkovanie v tabuľke zodpovedá preferovanej dennej dávke 0,5 mg pimobendanu/kg živej hmotnosti, rozdelenej na dve denné dávky (každá 0,25 mg/kg živej hmotnosti).

Udržiavacia dávka by mala byť upravená v súlade s klinickou odpoveďou a závažnosťou ochorenia (0,2-0,6 mg/kg denne).

Cardisure perorálny roztok 3,5 mg/ml
42 ml s 1,5 ml dávkovacou striekačkou | 168 ml s 3 ml dávkovacou striekačkou.



Cymedica SK, s.r.o. | Družstevná 1415/8 | SK 960 01 Zvolen
+421 45 54 000 40 | info@cymedica.sk | www.cymedica.com