

# FELIMAZOLE®

 Léčivá látka Thiamazol



## Hlavní vlastnosti

- K dispozici ve formě roztoku a tablet
- Tři síly tablet (1,25 mg, 2,5 mg a 5 mg), barevně označené pro snadné rozlišení
- Síla roztoku = 5 mg/ml
- Roztok má příchut' medu pro lepší dodržování léčby



## Indikace

- Stabilizace hypertyreózy u koček před chirurgickou tyreoidektomií
- Dlouhodobá léčba hypertyreózy u koček



## Podpora

- Endokrinologická aplikace
- Dechra Academy
- [www.cymedica.com](http://www.cymedica.com)

## ? Prodejní otázky

Jak v současné době léčíte hypertyreózu u koček?

Co ovlivňuje vaše rozhodování při volbě léčby?

Víte, že Dechra nabízí Felimazole® ve dvou různých lékových formách?

## Časté námítky veterinářů

### • U koček preferujeme transdermální aplikaci

- V Británii ani Evropě dnes není k dispozici transdermální přípravek obsahující thiamazol, který by byl schválen k veterinárnímu použití. U lékových forem připravených v lékárnách může docházet k proměnlivé absorpci léčivé látky.

### • Jsme spokojeni se stávajícím dodavatelem, proč bychom měli přecházet ke společnosti Dechra?

- Chápeme, že vám stávající dodavatel vyhovuje. Přesto alespoň zvažte výhody přechodu na přípravky společnosti Dechra. Jelikož nabízíme přípravek **ve formě roztoku (balení 30 ml a 100 ml) i tablet (síly 1,25 mg, 2,5 mg a 5 mg)**, je možné léčbu přizpůsobit potřebám konkrétních pacientů a preferencím jejich majitelů.
- Společnost Dechra ve spolupráci se společností Cymedica vám nabízí také **spolehlivý systém technické podpory**, jehož prostřednictvím vám pomůžeme účinně léčit případy hypertyreózy.



Cymedica CZ, a.s. | Pod Nádražím 308 | CZ 268 01 Hořovice | tel.: +420 311 706 211  
fax: +420 311 706 200 | e-mail: [info@cymedica.cz](mailto:info@cymedica.cz) | [www.cymedica.com](http://www.cymedica.com)



	Felimazole	Thiafeline	Apelka	Vidalta	Thiamacare	Thiamatab & Thyrasol Oral
Společnost	Dechra Veterinary Products	Le Vet Beheer, B.V.	BIV (Norbrook)	MSD	Ecuphar	Cp-pharma
Léčivá látka	Thiamazol	Thiamazol	Thiamazol	Karbimazol	Thiamazol	Thiamazol
Léková forma	Tablety Perorální roztok	Tablety	Perorální roztok	Tablety	Perorální roztok	Tablety (Thiamatab) Perorální roztok (Thyrasol)
Koncentrace	1,25 mg, 2,5 mg, 5 mg, 5 mg/ml	1,25 mg, 2,5 mg, 5 mg	5 mg/ml	10 mg 15 mg	10 mg/ml	1,25 mg, 2,5 mg, 5 mg, 5 mg/ml
Balení	4 x 25 tablet v blistru	4x 30 tablet v blistru	30 ml, balení 100 ml zatím není v nabídce v CZ/SK	Lahvičky po 100 tabletách	30 ml	25 tablet v blistru 30 ml, 50 ml a 100 ml
Příchuť roztoku	Medová	N/A	Medová	N/A	Vanilka	Anýz a sladidlo
Způsob podání	Tablety: Pouze pro perorální podání Roztok: Přímě do dutiny ústní	Tablety: Pouze pro perorální podání Roztok: Přímě do dutiny ústní	K perorálnímu podání	Pouze pro perorální podání Podání s krmivem zlepšuje biologickou dostupnost.	K perorálnímu podání	Tablety: Pouze pro perorální podání Roztok: Přímě do dutiny ústní
Doporučená počáteční dávka	Tableta: 5 mg denně, rozděleno pokud možno do dvou stejných dávek Roztok: 5 mg denně (1 ml přípravku), rozděleno pokud možno do dvou stejných dávek	Tableta: 5 mg denně, rozděleno pokud možno do dvou stejných dávek	5 mg (1 ml přípravku) denně, nejlépe rozděleno do dvou dávek; přímě do dutiny ústní	15 mg denně v jedné dávce; 10 mg denně při tT4 mezi 50 nmol/l a 100 nmol/l	5 mg (0,5 ml přípravku) denně, nejlépe rozděleno do dvou dávek; přímě do dutiny ústní	Tableta: 5 mg denně, rozděleno pokud možno do dvou stejných dávek Roztok: 5 mg denně (1 ml přípravku), rozděleno pokud možno do dvou stejných dávek
Indikace	Stabilizace hypertyreózy u koček před chirurgickou tyreoidektomií. Dlouhodobá léčba hypertyreózy u koček.	Stabilizace hypertyreózy u koček před chirurgickou tyreoidektomií. Dlouhodobá léčba hypertyreózy u koček.	Stabilizace hypertyreózy u koček před chirurgickou tyreoidektomií. Dlouhodobá léčba hypertyreózy u koček.	Léčba hypertyreózy a klinických příznaků spojených s hypertyreózou u koček.	Stabilizace hypertyreózy u koček před chirurgickou tyreoidektomií. Dlouhodobá léčba hypertyreózy u koček.	Stabilizace hypertyreózy u koček před chirurgickou tyreoidektomií. Dlouhodobá léčba hypertyreózy u koček.
Doba použitelnosti	Tableta: 3 roky Roztok: 2 roky Po otevření – 6 měsíců	3 roky	2 roky Po otevření – 6 měsíců	24 měsíců Po otevření – 100 dnů	2 roky Po otevření – 3 měsíců	Tableta: 4 roky Roztok: 2 roky Po otevření – 3 měsíců

Více informací naleznete na [www.cymedica.com](http://www.cymedica.com) v sekci Knihovna – Ostatní produkty – Felimazole nebo po načtení QR kódu



Cymedica CZ, a.s. | Pod Nádražím 308 | CZ 268 01 Hořovice | tel.: +420 311 706 211  
fax: +420 311 706 200 | e-mail: [info@cymedica.cz](mailto:info@cymedica.cz) | [www.cymedica.com](http://www.cymedica.com)

